

总花青素（总花色苷）含量试剂盒说明书

（货号：G0126F 分光法 48 样）

一、产品简介：

花青素是一种广泛存在于自然界植物中的水溶性天然色素，但是在自然状态下常与各种单糖形成糖苷形式存在，即**花色苷**。它是植物细胞中可见的植物水溶性色素，存在于几乎所有的陆地植物的根、茎、叶、花及果实中；且还具有较强的抗氧化活性，能够清除自由基。

本试剂盒采用 PH 示差法，花色苷的颜色随 PH 值的改变而发生变化，而干扰物质的特征光谱不随 PH 的改变而变化。pH 为 1 时，花色苷以红色的 2-苯基苯并吡喃的形式存在。pH 为 4.5 时，花色苷以无色的甲醇假碱形式存在，通过确定两个对花色苷吸光度差别最大，但是对花色苷稳定的 pH 值（一般选择 pH 值为 1.0 和 4.5），在最大吸收波长为 700 nm 处，花色苷溶液的吸光度差值与花色苷的含量成比例，进而计算得出花色苷总量。

二、试剂盒组分与配制：

试剂名称	规格	保存要求
提取液	液体 50mL×1 瓶	4℃ 保存
试剂一	液体 20mL×1 瓶	4℃ 保存
试剂二	液体 20mL×1 瓶	4℃ 保存

三、所需的仪器和用品：

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿（光径 1cm）、水浴锅、可调式移液器、研钵和蒸馏水。

四、总花青素含量的测定：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本制备

① 组织样本（本方法不适合叶绿素为主要干扰因素的样本）：

称约 0.1g 样品（水分充足的样本，可取样 0.5g），加入 1mL 提取液，95℃ 震荡提取 30min，若提取过程中提取液有损失，最后可用提取液定容至 1mL 后，室温 12000rpm，离心 10 min，上清液待测。

【注】：若是固体样本，可取 0.05 磨碎并过 40 目筛后的干样，再加入 1 mL 提取液，其他步骤同上。
最后离心得到的上清液待测。

② 液体样本：

澄清的液体的样本直接测定，若浑浊则离心后取上清液检测。

2、上机检测

① 可见分光光度计预热 30min 以上，用蒸馏水调零。

② 对于含量较高的样本，可先选取 2 个样本做预测定，找出适合本次检测样本的稀释倍数 D（用蒸馏水进行稀释即可）。

③ 在 1mL 玻璃比色皿（光径 1cm）中依次加入：

试剂名称（ μL ）	测定管	对照管
上清液	400	400
试剂一	400	
试剂二		400

室温避光平衡 60min，上清液全部转移至 1mL 玻璃比色皿中，分别测定 530nm 和 700nm 处的吸光值。测定管记作 $A_{\text{测定}}=A_{530}-A_{700}$ ；对照管记作 $A_{\text{对照}}=A_{530}-A_{700}$ ； $\Delta A=A_{\text{测定}}-A_{\text{对照}}$ 。

【注】：若 A_1 大于 1.5，则上清液可用蒸馏水进行稀释，稀释后的上清液再按照上述加样表操作。稀释倍数 D 需代入计算公式计算。

五、结果计算：

1、按照样本质量计算：

$$\begin{aligned} \text{总花青素含量(mg/g)} &= (\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V_2 \times 10^3 \times Mr) \div (W \times V_1 \div V) \times D \\ &= 0.0334 \times \Delta A \div W \times D \end{aligned}$$

2、按照样本浓度计算：

$$\begin{aligned} \text{总花青素浓度(mg/mL)} &= (\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V_2 \times 10^3 \times Mr) \div V_1 \times D \\ &= 0.0334 \times \Delta A \times D \end{aligned}$$

ϵ ---为矢车菊-3-葡萄糖苷消光系数，26900 L/mol /cm；

Mr --- 为矢车菊素-3-葡萄糖苷分子量，449.2；

d ---光程，1cm；

D ---稀释倍数，未稀释即为 1；

V ---样本提取液，1mL；

W ---样本重量，g；

V_1 ---检测操作表里上清液加样体积，400 μ L=0.4mL；

V_2 ---检测总体积，800 μ L =8 $\times 10^{-4}$ L；