

土壤亚硝酸还原酶 (Soil-Nitrite reductase, S-NiR) 试剂盒说明书

(货号: G0310F 分光法 24 样)

一、产品简介:

土壤亚硝酸还原酶是反硝化作用的关键酶,它是由土壤反硝化细菌产生的一种还原类酶,参与亚硝酸盐至 NO 的还原反应,它的活性反映了生物降解过程中氮素的转化效率,为氮素转化规律的研究提供一定的依据。

土壤亚硝酸还原酶可将 NO₂-还原为 NO,使样品中参与重氮化反应生成(粉)红色化合物的 NO₂-减少,该(粉)红色物质在 540nm 有最大吸收峰,通过检测 540nm 处吸光值的变化来反应土壤亚硝酸还原酶的活性。

二、试剂盒组分与配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
试剂一	液体 15mL×1 瓶	4°C 保存	
试剂二	液体 30mL×1 瓶	4°C 保存	有沉淀,临用前混匀即可
试剂三	液体 12mL×1 瓶	4°C 保存	试剂会出现过饱和,临用前 25°C 水浴, 5min 即可使用。
试剂四	A 液 21mL×1 瓶	4°C 保存	临用前,可依据待检测样本数量,把 A 液和 B 液等比例混合成无色的反应 mix (注意观察,若变粉色,则不能使用),两天之内用完。
	B 液 21mL×1 瓶		
标准品	粉体 mg×1 支	4°C 保存	若重新做标曲,则用到该试剂

三、所需的仪器和用品:

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿(光径 1cm)、天平、水浴锅、低温离心机、可调式移液器。

四、土壤亚硝酸还原酶(S-NiR)的测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定,了解本批样品情况,熟悉实验流程,避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备

取新鲜土样风干或者 37 度烘箱风干,先粗研磨,过 40 目筛网,备用。

【注】:土壤风干,减少土壤中水分对于实验的干扰;土壤过筛,保证取样的均匀细腻;

2、测定步骤

① 可见分光光度计预热 30min 以上,调节波长至 540nm,蒸馏水调零。

② 在 EP 管中依次加入:

试剂名称 (μL)	测定管	无基质对照管	无土对照管 (仅做一次)
土样 (g)	0.1	0.1	
试剂一	400		400
蒸馏水	800	1200	800
试剂二	500	500	500
混匀,且务必用封口膜封口,25°C,培养 24h			
试剂三	200	200	200

混匀，12000rpm，4℃离心 10min，上清液待用

③ 显色反应，②步得到的上清液用蒸馏水稀释 70 倍后，在 EP 管中依次加：


上清液	70	70	70
反应 mix	700	700	700

混匀，25℃反应 5min（准确时间），取出全部澄清液体至 1mL 玻璃比色皿（光径 1cm）中，立即于 540nm 处读取 A 值， $\Delta A = A - \text{无土对照管} - (\text{A 测定管} - \text{无基质对照管})$ ，（每个样本需做一个自身对照）。

【注】：若 ΔA 值低于 0.01，可增加土壤样本取样质量 W（如由 0.1g 增至 0.25g），则改变后的 W 需带入公式重新计算。

五、结果计算：

1、标准曲线方程： $y = 3.5252x - 0.0036$ ；x 为标准品浓度（ $\mu\text{mol/mL}$ ），y 为吸光值 ΔA 。



2、单位定义：每克土样每天还原 $1\mu\text{mol}$ 的 NO_2^- 量为一个酶活力单位。

$$\begin{aligned} \text{S-NiR}(\mu\text{mol/d/g 土壤}) &= [(\Delta A + 0.0036) \div 3.5252 \times V1] \div W \div T \times D \\ &= 0.54 \times (\Delta A + 0.0036) \div W \times 70 \end{aligned}$$

3、单位定义：每克土样每天还原 $1\mu\text{g}$ 的 NO_2^- 量为一个酶活力单位。

$$\begin{aligned} \text{S-NiR}(\mu\text{g/d/g 土壤}) &= [(\Delta A + 0.0036) \div 3.5252 \times V1] \div W \div T \times 46 \times D \\ &= 24.8 \times (\Delta A + 0.0036) \div W \times 70 \end{aligned}$$

V1---反应体系总体积， $1900\mu\text{L} = 1.9\text{mL}$ ；

T---反应时间， $24\text{h} = 1\text{d}$ ；

W---土样实际质量，g；

D---稀释倍数，70 倍；

标准品的分子量---69；

NO_2^- 的分子量---46。

附：标准曲线制作过程：

- 1 制备标准品母液（ $100\mu\text{mol/mL}$ ）：把标准品完全溶解于 1mL 蒸馏水中（母液需在两天内用且 -20°C 保存）。
- 2 把母液用蒸馏水稀释成六个浓度梯度的标准品：0, 0.06, 0.12, 0.18, 0.24, 0.3 $\mu\text{mol/mL}$ 。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 3 依据显色反应阶段的测定管的加样顺序操作，根据结果即可制作标准曲线。