

## 抗性淀粉含量（酶法）试剂盒说明书

（货号：G05106W48 微板法 48 样）

### 一、产品简介：

本试剂盒利用 $\alpha$ -胰淀粉酶和淀粉葡萄糖苷酶使非抗性淀粉水解成 D-葡萄糖，剩余的沉淀即为样品中的抗性淀粉，利用强碱溶液溶解抗性淀粉，再利用淀粉葡萄糖苷酶将其进一步水解成葡萄糖。通过检测葡萄糖含量得到非抗性淀粉和抗性淀粉的含量。

### 二、试剂盒的组成和配制：

| 试剂名称 | 规格           | 保存要求   | 备注                                                                                                   |
|------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 试剂一  | 液体 30mL×1 瓶  | 4℃保存   |                                                                                                      |
| 试剂二  | 粉剂 mg×1 瓶    | 4℃保存   | 临用前甩几下使粉剂落入底部，加 22mL 试剂一持续混匀 5min，再加 0.02mL 试剂七混匀，4000rpm 离心 10min，取上清保存备用。                          |
| 试剂三  | 自备           | 4℃保存   | 50%乙醇：45mL 无水乙醇加入 45mL 蒸馏水，混匀，备用。                                                                    |
| 试剂四  | 液体 12mL×1 瓶  | 4℃保存   |                                                                                                      |
| 试剂五  | 自备           | 4℃保存   | 0.1M 乙酸-乙酸钠 PH4.5（配制见附录）                                                                             |
| 试剂六  | 液体 45mL×1 瓶  | 4℃保存   |                                                                                                      |
| 试剂七  | 液体 0.6mL×1 支 | 4℃保存   | 用前甩几下使液体试剂落入底部。                                                                                      |
| 试剂八  | 液体 1.2mL×1 支 | 4℃保存   |                                                                                                      |
| 试剂九  | 液体 12mL×1 瓶  | 4℃保存   |                                                                                                      |
| 标准品  | 粉体 mg×1 支    | 室温干燥保存 | 准确称取 2mg 标准品（葡萄糖）至一新 EP 管中，再加 1mL 试剂五充分溶解即得 2mg/mL 标准品，再用试剂五稀释 4 倍至 0.5mg/mL 备用。（该标准品粉体开封后也需干燥保存和使用） |

### 三、所需的仪器和用品：

酶标仪、96 孔板、水浴锅、可调式移液器、研钵、乙醇、冰乙酸、乙酸钠、冰水浴和蒸馏水。

### 四、抗性和非抗性淀粉含量测定：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

#### 1、样本制备：

#### 抗性淀粉待测液制备：

- ① 取 1-5g 样本烘干（50℃）至恒重，磨碎并过筛（如 100 目筛）得到待检均匀粉末样本，取 10mg 粉末至 2mLEP 管中，（若样本含糖，需先除糖：向沉淀中加入 1mL 的 80%乙醇，室温静置 30min(间隔 5min 振荡混匀一次)，5000rpm 室温离心 10min，弃上清留沉淀，室温条件下待乙醇挥发完（也可用吸水纸除干净乙醇）（整个除糖过程不能高温），再向 EP 管中加 0.4mL 试剂二，涡旋，水平放置于震荡培养箱中，37℃、200rpm 往复震荡培养 16 小时（下午 4 点至次日上午 8 点）。
- ② 取出加入 0.4mL 无水乙醇，涡旋震荡，5000rpm 室温离心 10min，弃上清，留沉淀。向沉淀中加入 0.2mL 试剂三，涡旋，再加 0.6mL 试剂三，涡旋混匀，5000rpm 室温离心 10min，弃上清，留沉淀，重复操作一次。
- ③ 在冰浴条件下，向上述有沉淀的 EP 管中，一边用手震荡一边缓慢加入 0.2mL 试剂四，

震荡直到完全溶解，冰浴或者放置 4℃冰箱 10min。取出加入 0.8mL 试剂六，颠倒混匀（不能涡旋），立即加入 10μL 试剂七混匀后，50℃孵育 30min(间歇混匀 5-6 次)。

- ④ 孵育完成后冷却至室温，对于 RS<10%的样本，直接 3000rpm 室温离心 5min；RS>10%的样本，用蒸馏水稀释 10 倍后再离心。

## 2、上机检测：

① 酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 510nm。

② 试剂八、九预先解冻至室温（25℃）。

③ 在 96 孔板中依次加入：

| 试剂名称<br>(μL)                         | 抗性淀粉<br>测定管     | 空白管<br>(仅做一次) | 标准管<br>(仅做一次)        |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------|
|                                      | 10μL<br>抗性淀粉上清液 |               | 10μL<br>0.5mg/mL 葡萄糖 |
| 试剂五                                  | 50              | 60            | 50                   |
| 试剂八                                  | 20              | 20            | 20                   |
| 试剂九                                  | 200             | 200           | 200                  |
| 混匀，50℃下，避光温育 20min，于 510nm 处读取吸光值 A。 |                 |               |                      |

## 五、结果计算：

### 1、按样本干重计算：

$$\begin{aligned} \text{抗性淀粉含量(mg/g 干重)} &= (C \text{ 标准} \times V_2) \times (A \text{ 抗性淀粉} - A \text{ 空白}) \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \\ &\quad \div (W \times V_2 \div V_1) \times D \times 162 \div 180 \\ &= 0.505 \times (A \text{ 抗性淀粉} - A \text{ 空白}) \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \div W \times D \times 162 \div 180 \end{aligned}$$

V1---抗性淀粉待检液体积，1.01mL；

V2---显色反应中上清液体积，0.01mL；

D---稀释倍数，未稀释即为 1；

C 标准---0.5mg/mL 葡萄糖；

W---样本质量，g。

附录：0.1M 乙酸-乙酸钠 PH4.5 试剂配制：

A 母液（0.2mol/L 乙酸溶液）：量取 5.775mL 冰乙酸，稀释至 500mL。

B 母液（0.2mol/L 乙酸钠溶液）：称取 8.2g 无水乙酸钠（Mr=82.04）或者 13.61g 三水合乙酸钠（Mr=136.09）溶解，定容至 500mL。

取 A 母液 51.0mL，B 母液 49.0mL，混合，用 A 母液调节 PH 值至 4.5 后，用蒸馏水定容至 200mL。

（可根据实际需要量同比例缩小或扩增）