

二氢黄酮醇还原酶(dihydroflavonol 4-reductase,DFR)试剂盒说明书

(G1008W 微板法 48 样)

一、产品简介:

二氢黄酮醇还原酶(DFR, EC 1.1.1.219)是花色苷合成代谢中的一个关键酶,负责将 3 种二氢黄酮醇还原成无色花色苷。在决定植物的花色、叶色、果色和其他经济器官的色泽及其营养品质方面起着重要作用。

二氢黄酮醇还原酶(DFR)作用于二氢槲皮素产生儿茶素,可与香草醛缩合形成红色化合物,在 500nm 处有特征吸收峰进而得出 DFR 的酶活性大小。

二、试剂盒组分与配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 60mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	液体 15mL×1 瓶	4℃保存	
试剂二	粉体×3 支	4℃保存	临用前离心或甩几下使试剂落入底部,每支再加 0.5mL 乙醇充分溶解,4℃保存。
试剂三	粉体×1 支	-20℃保存	用前甩几下或离心使粉剂落入底部,分别加 1.1mL 蒸馏水溶解备用。用不完的试剂分装后-20℃保存,禁止反复冻融,三天内用完。
试剂四	粉体×1 瓶	4℃保存	临用前离心或甩几下使试剂落入底部,再加 18mL 盐酸充分溶解,4℃保存。
标准品	粉体×1 支	4℃保存	若重新做标曲,则用到该试剂。

三、所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、台式离心机、可调式移液器、乙酸乙酯、无水乙醇、研钵、冰。

四、二氢黄酮醇还原酶(DFR)活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定,了解本批样品情况,熟悉实验流程,避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备:

称取约 0.1g 组织,加入 1mL 提取液,进行冰浴匀浆。12000rpm 4℃离心 15min,取上清,置冰上待测。

【注】:若增加样本量,可按照组织质量(g):提取液体积(mL)为 1: 5~10 的比例提取。

2、上机检测:

- ① 酶标仪预热 30min 以上,温度设定 25℃,调节波长至 500nm。
- ② 试剂放在 40℃水浴 5min;
- ③ 按照下表在 EP 管中依次加入试剂:

试剂名称(μL)	测定管	对照管
样本	40	40
试剂一	130	150
试剂二	20	
试剂三	10	10
混匀, 40℃反应 30min		
乙酸乙酯	200	200

37℃震荡 10min, 取上层溶液, N2 吹干 (若没有氮吹仪设备, 可 70℃下蒸发干)。

无水乙醇	100	100
------	-----	-----

充分震荡混匀, 待检液按照下表操作


④ 在 96 孔板中直接加入以下试剂:

试剂名称 (μL)	测定管	对照管
待检液	50	50
试剂四	150	150
混匀, 25℃静置 3min, 立即于 500nm 处读取吸光值 A (10min 内读值完成)。ΔA=A 测定管-A 对照管 (每个样本做一个自身对照)。		

【注】: 1. 若 ΔA 小于 0.01, 可延长反应时间 T (如: 50min 或更长), 或加大样本量 V1 (如增至 80μL, 试剂一相应减少), 重新调整后的 T 和 V1 需代入计算公式重新计算。
2. 若 A 测定大于 2, 可对第④步的待检液用蒸馏水稀释后测定, 则稀释倍数 D 带入公式计算。

五、结果计算:

1、标准曲线方程为: $y=0.0195x-0.0012$, x 是标准品浓度 (μg/mL), y 是 ΔA。



2、按样本蛋白浓度计算:

酶活定义: 每毫克蛋白每小时分解二氢槲皮素产生 1μg 儿茶素所需酶量为一酶活单位(U)。

$$\text{DFR}(\mu\text{g/h/mg prot}) = [(\Delta A + 0.0012) \div 0.0195 \times V_{\text{乙醇}}] \div (V1 \times \text{Cpr}) \div T \times D$$

$$= 256.5 \times (\Delta A + 0.0012) \div \text{Cpr} \times D$$

3、按样本鲜重计算:

酶活定义: 每克样本每小时分解二氢槲皮素产生 1μg 儿茶素所需酶量为一酶活单位 (U)。

$$\text{DFR}(\mu\text{g/h/g 鲜重}) = [(\Delta A + 0.0012) \div 0.0195 \times V_{\text{乙醇}}] \div (W \times V1 \div V) \div T \times D$$

$$= 256.5 \times (\Delta A + 0.0012) \div W \times D$$

V---加入提取液体积, 1 mL;

V1---加入样本体积, 0.04 mL;

T---反应时间, 30 min=0.5h;

V_{乙醇}---0.1mL;

D---稀释倍数, 未稀释即为 1;

W---样本质量, g;

Cpr---样本蛋白质浓度, mg/mL, 建议使用本公司的 BCA 蛋白含量测定试剂盒。

附: 标准曲线制作过程:

- 1 标准品母液 (1mg/mL): 临用前加 1mL 无水乙醇溶解 (1mg/mL)。
- 2 用无水乙醇把标准品稀释成以下浓度: 0, 10, 20, 30, 40, 50. μg/mL。
- 3 按照第④步骤测定管的加样表操作, 依据结果即可制作标准曲线。