

β-木糖苷酶 (β-xylosidase) 活性测定试剂盒说明书

(货号: G0712F 分光法 24 样)

一、产品简介：

β-木糖苷酶(EC3.2.1.37)是一类重要的木聚糖降解水解酶，存在于植物、细菌和真菌等生物体，主要从非还原末端把木二糖和低聚木糖催化切割为木糖单体，产物木糖可作为碳源应用于微生物发酵。另外，β-木糖苷酶还可以作为生物漂白剂应用于造纸工业，比传统的漂白法环保，具有广泛的应用价值。

β-木糖苷酶催化对硝基苯酚-β-D-木糖苷产生对硝基苯酚 (PNP)，该产物在 405nm 处有特征吸收峰，通过测定 405nm 光吸收增加速率，即可计算β-木糖苷酶活性。

二、试剂盒的组成和配制：

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 30mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	粉剂 mg×1 支	4℃保存	使用前甩几下使试剂落入底部，再加 2mL 蒸馏水溶解备用。
试剂二	液体 6mL×1 瓶	4℃保存	
试剂三	液 27mL×1 瓶	4℃保存	
标准品	粉剂×1 支	4℃保存	若重新做标曲，则用到该试剂。

三、所需的仪器和用品：

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿 (光径 1cm)、可调式移液器、低温离心机、天平、研钵、冰和蒸馏水。

四、β-木糖苷酶活性测定：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本的制备：

① 组织样本：取约 0.1g 组织 (水分充足的样本可取 0.5g)，加入 1mL 提取液，进行冰浴匀浆。12000rpm，4℃离心 10min，取上清，置冰上待测。

【注】若增加样本量，可按照组织质量(g)：提取液体积(mL)为 1:5~10 比例提取。

② 细菌或细胞：先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；取约 500 万细菌或细胞，加入 1mL 提取液，超声波破碎细菌或细胞 (冰浴，功率 20% 或 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次)；12000rpm，4℃离心 10min，取上清，置冰上待测。

【注】若增加样本量，可按照细菌或细胞数量(10^4 个)：提取液体积(mL)为 500~1000:1 的比例提取。

③ 液体样本：直接检测。若浑浊，离心后取上清检测。

2、上机检测：

① 可见分光光度计预热 30min，调节波长至 405nm，蒸馏水调零。


② 在 EP 管中依次加入：

试剂名称 (μL)	测定管	对照管
样本	60	60
试剂一	75	
蒸馏水		75
试剂二	105	105
迅速混匀，45℃保温 20min		
试剂三	540	540
混匀，取全部澄清液体转移至 1mL 玻璃比色皿中，于		

405nm 处测定吸光值 A, $\Delta A = A - A_{\text{对照}}$ (每个测定管需设一个对照管)。

五、结果计算:

1、标准曲线方程: $y = 0.0211x - 0.0004$; x 为标准品摩尔质量 (nmol), y 为 ΔA 。



2、按蛋白浓度计算:

定义: 45°C下, 每毫克蛋白每分钟催化产生 1 nmol 对硝基苯酚 (PNP) 为一个酶活单位。

$$\beta\text{-木糖苷酶活性}(\text{nmol}/\text{min}/\text{mg prot}) = (\Delta A + 0.0004) \div 0.0211 \div (V1 \times Cpr) \div T$$

$$= 39.5 \times (\Delta A + 0.0004) \div Cpr$$

3、按样本质量计算:

定义: 45°C下, 每克组织每分钟催化产生 1 nmol 对硝基苯酚 (PNP) 为一个酶活单位。

$$\beta\text{-木糖苷酶活性}(\text{nmol}/\text{min}/\text{g 鲜重}) = (\Delta A + 0.0004) \div 0.0211 \div (V1 \div V \times W) \div T$$

$$= 39.5 \times (\Delta A + 0.0004) \div W$$

4、按细胞数量计算:

定义: 45°C下, 每 10⁴ 个细胞每分钟催化产生 1 nmol 对硝基苯酚 (PNP) 为一酶活单位。

$$\beta\text{-木糖苷酶活性}(\text{nmol}/\text{min}/10^4 \text{ cell}) = (\Delta A + 0.0004) \div 0.0211 \div (V1 \div V \times \text{细胞数量}) \div T$$

$$= 39.5 \times (\Delta A + 0.0004) \div \text{细胞数量}$$

5、按液体体积计算:

定义: 45°C下, 每毫升液体每分钟催化产生 1 nmol 对硝基苯酚 (PNP) 为一个酶活单位。

$$\beta\text{-木糖苷酶活性}(\text{nmol}/\text{min}/\text{mL}) = (\Delta A + 0.0004) \div 0.0211 \div V1 \div T$$

$$= 39.5 \times (\Delta A + 0.0004)$$

V---加入提取液体积, 1mL;

V1---加入反应体系中样本体积, 60 μ L=0.06mL;

W---样本质量, g;

500---细胞或细菌总数, 500 万;

T---反应时间, 20min;

PNP 对分子质量---139.11。

Cpr---样本蛋白质浓度, mg/mL, 建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒;

附: 标准曲线制作过程:

- 1 制备标准品母液 (2mg/mL): 向标准品 EP 管里面加入 1mL 蒸馏水。
- 2 把母液用蒸馏水稀释成以下浓度梯度的标准品: 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 mg/mL。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 3 在 EP 管加入: 60 μ L 标准品+75 μ L 蒸馏水+105 μ L 试剂二+540 μ L 试剂三, 混匀, 取全部澄清液体转移至 1mL 玻璃比色皿中, 于 405nm 下读取吸光值。
- 4 根据结果制作标准曲线。